

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: درمان عفونت گنوکوکی با سفتریاکسون

باسلام و احترام

نظر به سوال برخی همکاران دانشگاهی و با توجه به اینکه در بوکلت سلامت میانسالان بر اساس آخرین دستورالعمل کشوری درمان عفونتهای آمیزشی در سال ۹۶ منتشر شده توسط مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، یکی از درمانهای در نظر گرفته شده برای عفونت گنوکوکی، تزریق عضلانی سفتریاکسون همراه با درمان خوراکی آزیترومایسین می باشد، متمنی است دستور فرمایید در صورت انتخاب درمان فوق توسط همکاران محترم در مراکز ارائه خدمت، عوارض ثبت شده داروی فوق در مرکز ADR ایران که در اطلاعیه شماره ۱۰۲ تاریخ ۸۹/۳/۲۹ و بخشنامه های بعدی سازمان غذا و دارو مورد تاکید قرار گرفته، مد نظر قرار گیرد و موارد زیر رعایت گردد:

۱. تجویز منطقی دارو: تجویز دارو فقط برای موارد دارای اندیکاسیون و با توجه به تداخلات دارویی توسط پزشک صورت گیرد. در صورت عدم وجود امکانات تزریق یا اطمینان پزشک از درمان کامل خوراکی توسط مراجعه کننده از درمانهای خوراکی ذکر شده در پروتکل کشوری استفاده شود. در هر حال انتخاب پروتکل درمانی برای عفونت شانکروئید یا گنوکوکی بر اساس پروتکلهای پیشنهادی کشوری به عهده پزشک می باشد.
 ۲. توجه به عوارض دارو و سابقه حساسیتهای قبلی فرد: حساسیت قبلی نسبت به سفتریاکسون یا سایر سفالوسپورینها (مانند سفالکسین، سفیکسیم، سفتازیدیم، سفازولین) و... یا پنی سیلینها مورد توجه قرار گیرد. مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سفتریاکسون یا سایر سفالوسپورینها ممنوع می باشد.
 ۳. فراهم بودن شرایط لازم برای حفظ ایمنی بیمار در زمان تزریق دارو: تزریق دارو در مراکز درمانی مجهز و توسط افراد حرفه ای مجرب و مانند هر آنتی بیوتیک تزریقی دیگری تحت نظر پزشک صورت گیرد.
 ۴. با توجه به اینکه نوع تزریق در نظر گرفته شده، برای درمان عفونت گنوکوکی، تزریق عضلانی می باشد، لازم است پودر آنتی بیوتیک داخل ویال ها درحلال مناسب آن کاملاً حل شده و به صورت عمقی و در عضلات بزرگ بدن صورت گیرد.
- اطلاع رسانی مناسب به همکاران محترم پزشک، ماما، مراقبین سلامت و بهورزان ارائه دهنده خدمت، همچنین مسئولین تزریقات در مراکزی که دارای امکانات تزریق می باشند، موجب مزید امتنان است.

دکتر سید حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس