

# فبرنامه ایمنی بیمار

## تغییرات CPR ۲۰۲۰ در مقایسه با CPR ۲۰۱۵

۱- تزریق اپی نفرین در آسیستول و PEA قبل از ماساژ.

۲- آمیودارون و لیدوکائین در احیا باهم از منظر استفاده کاملا با هم برابری داشته و اولویتی بر هم ندارند.

۳- در تاکی کاردی کودکان در صورت نیاز تنها داروی مورد استفاده آدنوزین می باشد.

۴- در رابطه با عمق فشردن قفسه ی سینه در اطفال و شیرخواران عمق فشردن قفسه ی سینه اینکه چند سانتی متر باشد مطرح نیست و گفته می شود به اندازه ی ۱/۳ قطر قدامی خلفی است.

۵- الگوریتم احیا در بیماران ایست قلبی تنفسی بیماران مسمومیت با مواد مخدر مجزا شده و برای امداد گران اولیه و حرفه ای دو پروتکل معین تعریف شده است

۶- اضافه شدن حلقه ای دیگر به زنجیره ی بقا که ریکاوری و حمایت روانی از بیمار احیا شده است

۷- اطفال و شیرخواران در صورت داشتن راه هوایی پیشرفته در ۲۰۲۰ گفته می شود هر ۲-۳ ثانیه یک تنفس باید داد

مسئول ایمنی : دی ۱۴۰۰