

نام و نام خانوادگی:	تاریخ پذیرش:	تشخیص:	پزشک معالج:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
<b>مراقبت در منزل :</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- از نگهداری شربت متادون، حتی در دوزهای بسیار پایین، در شیشه‌های غیر دارویی (نظیر بطری نوشابه و ...) و شیشه‌های بدون برچسب حاوی نام دارو اکیداً خودداری کنید.</li> <li>- در صورت امکان، تحویل دوز مورد نیاز به صورت روزانه در مراکز ترک اعتیاد انجام پذیرد.</li> <li>- شیشه‌های حاوی متادون می‌بایست دارای برچسب مخصوص هشدار دهنده حاوی نام فرآورده و توضیحات لازم مربوط به نحوه مصرف دارو باشند.</li> <li>- از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف می‌نمایند از نگهداری دارو در یخچال یا کنار سایر نوشیدنی‌ها خودداری کنید.</li> <li>- دارو را دور از دسترس اطفال و در قفسه‌های قفل دار نگهداری کنید.</li> <li>- از مصرف دارو در زمان حضور کودک خودداری کنید.</li> <li>- دارو را در ظرف‌هایی با درب مقاوم که کودک قادر به باز کردن آن نباشد نگهداری کنید.</li> <li>- به کودکانی که متوجه می‌شوند، خطرات مصرف آن را بگویید.</li> <li>- به کودک خود مایعات فراوان بدهید تا دارو هرچه سریع‌تر دفع شود.</li> <li>- ممکن است یبوست ایجاد شود بنابراین با مصرف مواد غذایی پرفیبر مانند سبزیجات و میوه می‌توان از یبوست جلوگیری کرد.</li> <li>- ممکن است تا مدتی کودک بی‌حال و دچار سرگیجه باشد در این زمان مراقب باشید تا سقوط نکند و زمین نخورد.</li> <li>- در زمان مشخص شده توسط پزشک جهت پیگیری درمان به بیمارستان مراجعه کنید.</li> <li>- در شروع درمان و نیز در تمام طول دوره مصرف دارو، علائم مسمومیت با متادون را سوال کنید.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اختلال هوشیاری، اختلالات تنفسی، نبض ضعیف، اختلالات گوارشی همچون تهوع و استفراغ و نیز سفتی و تکانه‌های عضلانی</li> <li>- سایر موارد نگران‌کننده و یا اورژانسی</li> </ul>			